

واحد بهبود کیفیت	به نام خدا	 بیمارستان موسی بن جعفر(ع) قوچان
	عنوان سند: داروهای مصرفی در بیماران دیالیزی	
شماره سند: M.04.N-H/16 تاریخ تدوین: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵		
شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۳/۰۷/۰۵		
شماره ویرایش: ۱ تاریخ بازنگری بعدی: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵		



با رویکرد خود مراقبتی به

مددجو و خانواده



● در صورت وجود هر گونه سوال در زمینه بیماری خود می
توانید همه روزه (به جز روزهای تعطیل) از ساعت ۸
تا ۱۲ با کلینیک پرستاری آموزش سلامت تماس
بگیرید.

شماره تلفن کلینیک پرستاری:

۲۲۷-۱۴-۴۷۲۳۳۴۱۲ داخلی

در صورت نیاز به سوال خارج از ساعت ذکر شده با

بخش بستری خود تماس بگیرید.

منبع:

۱. کتاب مرور الگوریتمی بر همودیالیز، نویسنده مریم جلال زاده-۱۳۹۰

۲. مبانی همودیالیز برای پرستاران-نویسنده جودیت زد. کالنباخ-

مترجم: دکتر و بهروز برومند

۳. <https://www.hamshahrionline.ir/>

۴. <https://nrc.tums.ac.ir/>

جهت دسترسی به اطلاعات آموزشی، بارکد زیر را اسکن
نمایید.



- در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه در پوشش بسته بندی نگهداری شود.
- **روکاترول ویا کلسیتریول:**
- در درمان کاهش سطح کلسیم خون استفاده می شود این دارو جذب کلسیم روده را افزایش میدهد.
- به صورت کپسول های ۰/۲۵ میلی گرمی استفاده می شود.
- سردرد، بی خوابی، ضعف، تهوع، یبوست، طعم فلز در دهان، بی اشتها، خشکی دهان
- دارو را میتوان همراه با غذا یا معده خالی مصرف کرد.
- دارو را با ظرف مقاوم به نور و در محل خشک و درجه حرارت ۱۵ تا ۳۰ درجه نگهداری کنید.
- از شکست یا جویدن یا خرد کردن کپسول جلوگیری کنید. در صورت بروز علائم به پزشک خود اطلاع دهید. در مصرف فرآورده های حاوی پتاسیم احتیاط کنید.
- این دارو را همزمان با داروهای مثل رانیتیدین، کلوکسترامین و داروهای ضد تشنج استفاده نکنید.
- این دارو اثرات روکاترول را کاهش می دهد.
- **رناژل:**
- کمک به پایین آوردن فسفر میکند و با اسید های صفراوی باند می شود و کلسترول خون را کاهش می دهد.
- به صورت قرص های روکشدار ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی گرمی استفاده می شود.
- عوارض آن می توان به سردرد تهوع و کاهش فشار خون اشاره کرد.
- باید حتما همراه با غذا مصرف شود.
- اگر فراموش کردید قرص را مصرف کنید از دور برابر کردن

مددجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با داروهای بیماران دیالیزی می باشد. امیدواریم نکات ذکر شده پاسخگوی سوالات شما باشد.

اپرکس:

- هورمون اریتروپوئیتین در کلیه های برای تحریک مغز استخوان جهت ساخت گلبول های قرمز تولید می شود. با زدن اپرکس به بدن این کمبود هورمون اریتروپوئیتین جبران می شود و به شماره برای داشتن انرژی بیشتر کمک می کند.
- دارو را به صورت آمپول های ۲۰۰۰ واحدی و ۴۰۰۰ واحدی و ۱۰۰۰۰ واحدی میتوان یافت.
- به صورت وریدی و زیرجلیدی تزریق می شود.
- عوارض آن میتوان به افزایش فشار خون و افزایش استعداد لخته اشاره کرد.
- فشار خون باید کنترل شود و در مصرف دارو های فشار خون دقت شود.

• نحوه نگهداری صحیح دارو

- از تکان دارو شدید امپول یا شیشه حتی درون جعبه خودداری کنید.
- اپرکس باید در یخچال در دمای بین ۲ تا ۸ درجه نگهداری شود.
- از مجاورت در نور و منابع گرمایی دور نگه دارید.
- از گرم کردن اپرکس با استفاده از مالش شدید در میان کف دست خودداری کنید.



• در صورت وجود یکی از موارد زیر دارو را استفاده نکنید:

- کدورت یا رنگی شدن دارو یا مشاهده زرات معلق
- خاموش شدن یخچال در اثر قطع برق
- گذشتن تاریخ انقضا
- حرارت بیش از ۲۵ درجه

• ونوفر:

از ترکیبات آهن ساکروز می باشد کمک به درمان کم خونی میکند.

- به صورت وریدی توسط پرستار بخش دیالیز تزریق می شود.
- از عوارض آن می توان به افت فشارخون و تهوع درد عضلانی سرگیجه احساس طعم فلزی در دهان اشاره کرد.
- نیاز به نگهداری در یخچال ندارد.
- حتما در مراکز درمانی تزریق شود.
- در زمان تجویز ونوفر قرص آهن قطع می شود.

• کربنات کلسیم:

- به عنوان پایین آوردنده فسفر و بالابرنده کلسیم عمل می کند.
- به شکل قرص های ۵۰۰ میلی گرمی استفاده می شود.
- از عوارض آن می تواند به یبوست و تهوع و خشکی دهان اشاره کرد.
- این دارو را به علت اصلاح کلسیم باید یک ساعت بعد از غذا میل کرد.
- اگر با هدف اصلاح فسفر باشد در وسط غذا مصرف میشود.