

درمان رتینوپاتی نوزادی یا آسیب شبکیه

چشم: حدود ۷۰-۸۰ درصد نوزادانی که

پس از معاینه متخصص چشم پزشکی

تشخیص آسیب شبکیه چشم داده

میشود بدون درمان خوب می شوند اما

ضروری است که جهت پیشگیری

از کوری و از دست دادن چشم و یا

اشکالات چشمی لازم است طبق

توصیه متخصص چشم پزشکی در

تاریخ تعیین شده مجدداً نوزادان معاینه

گردند + نوزادانی که در بیمارستان در

بخش های آی سی یو نوزادان بستری

می گردند در تاریخ های تعیین شده که

توسط بخش به آنها اطلاع داده می

شود نوزادان خود را جهت معاینه چشم

پزشکی به بیمارستان توصیه شده

ببرید.

۳- اکسیژن درمانی در نوزاد با توجه با اینکه

نوزادان نارس بعلت ناری در تمام

قسمت های بدن از جمله مغز / ریه / قلب /

گوارش / ...

با احتمال فراوان در بدو تولد جهت زنده

ماندن نوزاد پزشک مجبور به دادن

اکسیژن و تنفس کمکی و دستگاه تنفس

مصنوعی می باشد بنابراین احتمال آسیب

به عروق چشم افزایش می یابد +

۴- خونریزی مغزی نوزاد احتمال آسیب

شبکیه چشم را افزایش می دهد +

۵- نوزادان که تعویض خون می شوند یا دچار


عفونت خونی می گردند +

۶- علت ژنتیکی باعث افزایش احتمال آسیب

شبکیه چشم می گردد

۷- بیماری قلبی و عروقی نوزاد

رتینوپاتی زودرس



مددجوی گرامی این برگه آموزشی، حاوی

نکاتی جهت افزایش آگاهی شما در ارتباط با

آسیب شبکیه چشم در نوزاد نارس می باشد.

امیدواریم نکات ذکر شده پاسخگوی سوالات

شما باشد.

آسیب شبکیه چشم یا رتینوپاتی نوزاد نارس

چیست؟

رشد چشم نوزاد در رحم بین هفته های ۱۶ و ۱۷ شروع

میشود و حدود ۲-۳ ماه پس از تولد ادامه می یابد

بنابراین هر علتی که باعث اختلال در رشد چشم و

عروق شبکیه اتفاق بیافتد باعث اشکالات فراوانی در

چشم نوزاد نارس می گردد که می تواند تا کوری کامل

هم ایجاد کند +

عللی که باعث این امر می گردد شامل موارد

زیر است :

۱- نوزاد نارس با سن حاملگی کمتر از ۳۴ هفته هرچه

سن حاملگی کمتر باشد امکان مشکلات چشمی بیشتر

می گردد.